

ენდომოქსი 600

ENDOMOX 600

30 აბი ორალურად მიღებისთვის

შემადგენლობა: N-აცეტილ ცისტეინი, 5-MTHF, ბეტაინი, ვიტამინი B6, ვიტამინი B2, ვიტამინი B12

ინფორმაცია კვებითი ღირებულების შესახებ

შემადგენლობა	1 აბში	%VNR*
N - აცეტილ ცისტეინი	600 მგ	--
ბეტაინი	250 მგ	--
ვიტამინი B6	6 მგ	428
ვიტამინი B2	4.8 მგ	342
5-MTHF (ფოლატი)	400 მკგ	200
ვიტამინი B12	18 მკგ	720

*VNR: შესაბამისი კვებითი ღირებულებები ევროპის კავშირის 1169/2011-ის რეგულაციის შესაბამისად.

გლუტენის გარეშე და თავისთავად არ შეიცავს ლაქტოზას.

მისაღებია ვეგეტარიანელებისთვის.

ზოგიერთი ინფორმაცია ძირითადი ინგრედიენტების შესახებ:

5-MTHF (ფოლატი) ხელს უწყობს ჰომოცისტეინის ნორმალურ მეტაბოლიზმს და ამინო მჟავების ნორმალურ სინთეზს. **ვიტამინი B2** (რიბოფლავინი) ხელს უწყობს უჯრედების დაცვას ოქსიდაციური / ჟანგვითი სტრესისგან და რკინის ნორმალურ მეტაბოლიზმს. **ვიტამინები B6 და B12** (პირიდოქსინი და მეთილკობალამინი) ხელს უწყობენ ჰომოცისტეინის ნორმალურ მეტაბოლიზმს და ერითროციტების ნორმალურ ფორმირებას. **ბეტაინი** აუმჯობესებს კვერცხუჯრედის და სპერმის ხარისხს, ღვიძლის ფუნქციებს, ხელს უწყობს უჯრედების რეპარაციას და კარნიტინის წარმოქმნას. ის ასევე უზრუნველყოფს ორგანიზმს ჰომოცისტეინის მეტაბოლიზმში. **NAC**(N-აცეტილცისტეინი) არის მუკოლიზური და ინსულინსენსიტიზირებული ეფექტის მქონე აქტიური ინგრედიენტი. ის ასევე წარმოადგენს, როგორც ძლიერ **ანტიოქსიდანტს** და **ანტიინფლამაციური** ეფექტის მქონე სუბსტრატს.

ენდომოქსი® არეგულირებს ჰომოცისტეინის დონეს, ამცირებს თრომბოზების რისკს, აუმჯობესებს კვერცხუჯრედის და სპერმის ხარისხს, ამცირებს ინსულინრეზისტენტობას. ხელს უწყობს ცერვიკალური ლორწოს გამოყოფას და როგორც ანტიინფლამატორი, ბაქტერიული ვაგინოზების დროს ამცირებს ანთებითი პროცესების გადასვლას ნაყოფზე და სპონტანური/განმეორებითი აბორტების შემთხვევებს. ზრდის კლომიფენის ციტრატის ეფექტურობას, ხელს უწყობს კვერცხუჯრედის იმპლანტაციას და აუმჯობესებს ორსულობის დადგომის მაჩვენებლებს.

ჩვენებები და მიღების წესი:

N	ჩვენება	დოზირება	შენიშვნა
1	ორსულობის დაგეგმვა ქალებში, მათ შორის, ქალებში, სადაც აღინიშნება ჰიპერჰომოცისტეინემია	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	ჩასახვამდე 3 თვით ადრე
2	ქალები, მათ შორის ორსულები, სადაც ჰომოცისტეინის დონე ≥ 10 მკმოლი/ლ	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	მინიმუმ სამი თვე
3	ქალები, რომლებიც იღებენ ორალურ კონტრაცეფტივებს	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	კონტრაცეპტივის მიღების დაწყებამდე სამი თვით ადრე და კონტრაცეპტივის მიღების პერიოდებში
4	თრომბოფილია, თრომბოზები	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	მინიმუმ სამი თვე
5	პრეკლამფსია, ნაყოფის ზრდაში ჩამორჩენა, პლაცენტის ნაადრევი აშრევა, სპონტანური და განმეორებითი აბორტები, PCOS, კვერცხუჯრედის და სპერმის ხარისხის გაუმჯობესება	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	3-6 თვე
6	მიოკარდიუმის ინფარქტი, ათეროსკლეროზი, იშემიური ინსულტი, ჰიპერტენზია, ვენური და არტერიული თრომბოზები, ბადურის ვენის ოკლუზია	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	მინიმუმ სამი თვე
7	დემენცია და ალცჰეიმერის დაავადება	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	ხანგრძლივად
8	ფსორიაზი	1 ტაბლეტი დღეში ერთხელ	ხანგრძლივად

გაფრთხილებები

შეინახეთ სამ წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ გადაამეტოთ დღიურ რეკომენდირებულ დოზას. კვებითი დანამატები არ მოიაზრება მრავალფეროვანი და ბალანსირებული კვების და სწორი ცხოვრების სტილის შემცვლელად. არ მისცეთ პროდუქტი ბავშვებს 3 წლის ასაკამდე.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას, სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ვადის გასვლის თარიღი გათვალისწინებულია მთელი პროდუქტისთვის, რომელიც სწორად ინახება. არ მიიღოთ პროდუქტი, თუ იგი არის გახსნილი ან დაზიანებული.

შეფუთვა

ყვითელი ფერის 30 აბი, ორალური მიღებისთვის, 1.3 გ თითო აბი.

მწარმოებელი:

PIZETA PHARMA S.P.A

Via Bruno Simonucci, 3, 06135 Ponte San Giovanni PG/იტალია