

## ლიმფავენი

## Lymphaveine

საერთაშორისო დასახელება (აქტიური ნივთიერება): comb. Drug

კლინიკურ-ფარმაცოლოგიური ჯგუფი: ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი

გაცემის რეჟიმი: III ჯგუფი (ურეცეპტოდ)

შემადგენლობა:

| 2 ტაბლეტის შემადგენლობა                                          |         | RI*  |
|------------------------------------------------------------------|---------|------|
| ციტრუსის ბიოფლავონოიდები(ექსტრაქტი შეესაბამება 35% ფლავონოიდებს) | 600მგ   |      |
| გალიუმის აპარინის ექსტრაქტი                                      | 200მგ   |      |
| ყურძნის წიპწის ოლიგო-პროანთოცინიდეები(OPCs)                      | 75მგ    |      |
| გინკგოს ექსტრაქტი(გინკგო ბილობა)                                 | 50მგ    |      |
| რუტინი                                                           | 50მგ    |      |
| ქურცეტინი                                                        | 50მგ    |      |
| ბრომელაინი(1200GDU/გ)                                            | 20,8მგ  |      |
| მდოგვის ექსტრაქტი(Raphanus sativus)                              | 50მგ    |      |
| ძმერხლის ექსტრაქტი(Ruscus aculeatus)                             | 30მგ    |      |
| რუსკოგენინი                                                      | 3მგ     |      |
| სელენი                                                           | 40მგ    | 72%  |
| ბაბუაწვერას ექსტრაქტი(Taraxacum officinalis)                     | 20მგ    |      |
| მაგნიუმი                                                         | 112,5მგ | 30%  |
| კალიუმი                                                          | 80მგ    | 4%   |
| ვიტამინი C                                                       | 80მგ    | 100% |
| ვიტამინი B6                                                      | 1,4მგ   | 100% |
| ვიტამინი E                                                       | 12მგ    | 100% |

მოქმედების მექანიზმები:

### ლიმფური ცირკულაცია

ლიმფური ცირკულაციის გაუმჯობესებას ხელს უწყობს პრეპარატში შემავალი შემდეგი აქტიური კომპონენტები: გალიუმის აპარინი, ბრომელაინი, ბაბუაწვერას ექსტრაქტი, ციტრუსის ბიოფლავონოიდები, Mg, K, B6. ისინი ასტიმულირებენ ლიმფურ დრენაჟს, ხელს უწყობენ დამატებითი კოლატერალების გახსნას, უზრუნველყოფენ ორგანიზმის დეზინტოქსიკაციას და აქვთ სუსტად გამოსატული დიურეზული მოქმედება

### ვენური ცირკულაცია

ვენური ცირკულაციის გაუმჯობესებას განაპირობებს ყურძნის წიპწის ოლიგო-პროანთოცინიდი, გინკგო ბილობა, რუტინი, ქურცეტინი, რუსკოგენინი, ციტრუსის ბიოფლავონოიდები. ისინი ზრდიან როგორც ვენურ ცირკულაციას, ასევე ვენის კედლების და სარქველების ელასტიურობას და ხელს უწყობენ ვენური ნაკადის სწორ დინებას.

### **ანტიაგრეგაციული მოქმედება**

ანტიაგრეგაციული მოქმედება ვლინდება რუტინის, ბრომელაინის, გინკგო ბილობას და ვიტამინები- C და E-ს ჩართულობით. ისინი აინჰიბირებენ თრომბოციტების ადჰეზიას, ახანგრძლივებენ პროთრომბინის დროს და ააქტიურებენ პარციალური თრომბოპლასტინის დროს.

### **ჩვენებები:**

ვენური უკმარისობა/შეშუპება

ვარიკოზული დაავადებები

თრომბოფლებიტი

ლიმფოსტაზი, ლიმფორეა, ლიმფადემა, ლიმფანგიტი

კონსტიტუციური ტიპის შეშუპება

მცირე მენჯის დრუს სტაზი(ოვარიოვარიოცელე)

სათესლე ჯირკვლების ვარიოცელე

პრემენსტრუალური სინდრომი

ჰემოროიდული დაავადება

პერიფერიული და ცენტრალური მიკროცირკულაციის გაუმჯობესება

### **უკუჩვენება:**

მომატებული მგრძნობელობა/ალერგია მასში შემავალი რომელიმე კომპონენტის მიმართ, 14 წლამდე ასაკი, სისხლდენები

### **განსაკუთრებული მითითებები:**

თუ ლიმფავენის პარალელურად ღებულობთ რომელიმე ანტიკოაგულანტს და ჰიპოტენზიურ საშუალებას, პრეპარატის მიღების წინ დაეკითხეთ მკურნალ ექიმს

### **დოზირება და მკურნალობის ხანგრძლივობა:**

მიიღება 2 აბი ერთდროულად დღის პირველ ნახევარში ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე 30-60 დღე

### **გამომშვების ფორმა:**

მუყაოს ყუთი N4 ბლისტერი, ბლისტერზე N15 ტაბლეტი

### **მწარმოებელი: Laboratoire Les 3 Chenes**

ZA la Terre Ronde, Chem. de la Terre Ronde, 69770 Villechenève/საფრანგეთი