

ფერტილითი კაცი
FERTIL` I.T. MEN

საერთაშორისო დასახელება (აქტიური ნივთიერება): comb. Drug
კლინიკურ-ფარმაცოლოგიური ჯგუფი: ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი

გაცემის რეჟიმი: III ჯგუფი (ურეცეპტოდ)

ერთი საშუალების შემადგენლობა:

1	ინოზიტოლი	100მგ
2	გლუტათიონი	20მგ
3	ტაურინი	250მგ
4	ლიზინი	60მგ
5	L-კარნიტინი	2000მგ
6	L-არგინინი	560მგ
7	Co-Q10	30მგ
8	Zn	20მგ
9	Se	32მკგ
10	B1	1.27მგ
11	B2	1.6მგ
12	B3	18.4მგ
13	B5	6.9მგ
14	B8	58მკგ
15	B9	460მკგ
16	B12	2.9მკგ
17	ვიტამინი E	13.8მგ
18	ვიტამინი C	92მგ
19	Tribulus Terrestris	120მგ
20	Muira Puama	45მგ
21	Astragalus	45მგ
22	Asparagus	17.5მგ

მოქმედების მექანიზმი:

1. მეტაბოლური მარვენებლების გაუმჯობესება:

- * ინსულინსენსიტიზერები(ინოზიტოლები, L-კარნიტინი)
- * ქოლესტერინის დონის დაქვეითება(ინოზიტოლები, ვიტამინი B3)

2. ჰორმონალური მარვენებლების გაუმჯობესება:

- * ტესტოსტერონის სინთეზის სტიმულაცია(ინოზიტოლები, L-კარნიტინი, ტაურინი, ვიტამინი B5, Tribulus Terrestris, Muira Puama)
- * LH-სინთეზის სტიმულაცია(ინოზიტოლები, L-კარნიტინი, ტაურინი, Tribulus Terrestris)

3. სპერმატოგენეზის გაუმჯობესება:

- * L-კარნიტინი, ტაურინი, Tribulus Terrestris, Co-Q10, Asparagus, ვიტამინი C, ვიტამინი E

4. ერექციის და ლიბიდოს გაუმჯობესება:

- * Tribulus Terrestris, Muira Puama, Asparagus, ვიტამინი B3

5. ჰომოცისტეინის დონის კორექცია:

- * ვიტამინი B9 და ვიტამინი B12

6. ანტიოქსიდაციური სტრესის შემცირება:

- * L-კარნიტინი, L-არგინინი, გლუტათიონი, Co-Q10, Zn, Se, ვიტამინი C და E

7. სპერმატოზოიდების დნმ-ის ფრაგმენტაციის შემცირება:

- * გლუტათიონი, Co-Q10, ვიტამინები: C, E და B12

8. ფერმენტ აკროზინის გააქტიურება:

- * ვიტამინი B8 და Zn

9. სპერმატოზოიდების ხარისხის გაუმჯობესება:

- * დეფორმირებული კუდის აღდგენა და მობილურობის გაუმჯობესება(L-კარნიტინი, L-არგინინი, ტაურინი, გლუტათიონი, Co-Q10, ვიტამინები:C,E, B1, B2, B3, B5, B8, B12; Tribulus, Astragalus, Asparagus

ჩვენებები:

- * ოლიგოსპერმია
- * არაობსტრუქციული ოლიგოზოოსპერმია და აზოსპერმია
- * ტერატოზოოსპერმია
- * იდიოპათიური ოლიგოასტენოტერატოზოოსპერმია
- * ასტენოსპერმია
- * სქესობრივი დისფუნქცია-ლიბიდოს გაქრობა/შემცირება და ერექციული უკმარისობა
- * ინ ვიტრო განაყოფიერებისთვის(IVF) მომზადება

გამოყენების წესი: 1 საშუალო იხსნება ერთ ჭიქა ოთახის ტემპერატურის წყალში, მიიღება დღეში ერთხელ. მკურნალობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად და საშუალოდ შეადგენს 12 კვირას

გვერდითი მოვლენები

გვერდითი მოვლენები არ არის გამოვლენილი

უკუჩვენება:

18 წლამდე ასაკი, მომატებული მგრძნობელობა/ალერგია მასში შემავალი რომელიმე კომპონენტის მიმართ

გამოშვების ფორმა

მუყაოს ყუთი, N30 საშუალო

არ შეიცავს წებოს და ლაქტოზას

მწარმოებელი: Laboratoire Les 3 Chenes

ZA la Terre Ronde, Chem. de la Terre Ronde, 69770 Villechenève/საფრანგეთი